

Productadvies

Gerbera's.



Voordelen en kenmerken

Toepassing van ProAct in Gerbera's verbetert, onder normale omstandigheden, de calciumopname en de na-oogstkwaliteit. Behandelde planten genereren meer bloemen. Herhaling van de bespuiting ondersteunt de groei en een goede afrijping. Combinatietoepassing met gewasbeschermingsmiddelen verkort de stilstand van het gewas.

Bijkomende eigenschap van een ProAct-toepassing is het feit dat er meer calcium in de celwanden terecht komt. Hierdoor ontstaat een sterker gewas met een betere kwaliteit en houdbaarheid.

Bij beperkt beschikbaar calcium in de bodemvoorraad of substraat, vergroot een calciummeststof in de tankmix met ProAct de betrouwbaarheid. In het geval van calciumbemesting door middel van Natural Green, volstaat een dosering van 1,5 kg/ha.

Dosering en timing

Voor het gewenste effect van de ProAct-toepassing, is timing cruciaal. Voor snijgerbera's is één toepassing 14 dagen voor oogst met een interval van 14 dagen tijdens de oogstperiode, voldoende voor een goed resultaat. Beste resultaten worden bereikt door (blad)bespuiting, fertigatie is ook mogelijk.

Bij eigen vergelijkingsproeven (behandeld/onbehandeld) is het belangrijk om tijdens het spuiten geen drift te hebben. Eén microgram ProAct zorgt al voor activatie van het gewas en beïnvloedt het resultaat.



Demo's en proeven

Tijdens dit onderzoek in Mexico (2001) werd een toename in het aantal stelen geconstateerd. Tevens was de kwaliteit van de behandelde stelen beter tijdens de vaasleventesten. Categorie 1 zijn 'zeer goed ogende bloemen', categorie 5 zijn 'zeer slecht ogende bloemen'.

Het vaasleven is getoetst in een oplossing van aluminiumsulfaat tijdens een periode van 2 weken op kamertemperatuur. De kwaliteit van de bloemen is gescoord door visuele observatie.

Type	Doel	Timing	Dosering
Snijgerbera	Steel-/bloem-aantal, calcium-mobilisatie en oogstkwaliteit	2 weken voor bloei + iedere 14 dagen tot einde oogst	150 gram/ha
	Anti-stress	Tijdens hitteperiode / In combinatie met gewasbescherming	150 gram/ha
Potgerbera	Steel-/bloem-aantal, calcium-mobilisatie en oogstkwaliteit	Na oppotten, + iedere 14 dagen	150 gram/ha
	Transport-stress-vermindering (potgerbera's)	7-14 dagen voor transport	150 gram/ha

Dosering en timing



We Grow Soil.